

GENERALIDADES: RELAMPAGO es un rodenticida anticoagulante extremadamente eficaz para el control de ratas y ratones, a los que mata con una sola ingestión produciéndose la muerte varios días después de su consumo, por lo cual los roedores no relacionan el envenenamiento con el cebo.

El cebo RELAMPAGO contiene amargante que lo hace desagradable al paladar humano y por lo tanto es menos probable que se produzcan intoxicaciones agudas en el hombre, a menos que la ingestión sea deliberada.

Especies controladas, rata gris o de las cloacas (*Rattus norvegicus*), rata negra o de los techos (*Rattus rattus*), o ratón laucha (*Mus musculus*)

MODO DE USO: Su aplicación debe efectuarse utilizando cebaderas de difícil acceso para niños y animales domésticos, llave externa y anclaje para cebos en su interior. El diseño de las mismas debe evitar que personas o animales puedan ponerse en contacto con el cebo de manera intencional o accidentalmente.

Donde observe señales de presencia de roedores, coloque los cebos de RELAMPAGO en cebaderas

Para el control de rata gris o de las cloacas, colocar las cebaderas con los cebos RELAMPAGO en los senderos por donde transitan en las cuevas, en rincones oscuros, cerca de las fuentes de agua etc. Para el control de rata negra o de los techos, colocar además en los lugares por donde suben al techo, en los tirantes, estanterías, etc

DOSIS:

- **RATONES:** colocar en cebaderas de 1 a 4 cebos RELAMPAGO en una cueva y 1 cebo cada 2 a 5 mts.
- **RATAS:** colocar en cebaderas de 7 a 8 cebos RELAMPAGO en cada cueva y de 7 a 8 cebos cada 5 a 10 mts.

Los lugares de colocación de las cebaderas, así como también la cantidad de cebos dentro de las cebaderas va a depender de la cantidad de roedores.

Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en el material fecal de los roedores pudiendo ser esta la fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado.

INTERVALOS DE APLICACIÓN: examinar los lugares de colocación de las cebaderas con los cebos a los 3 días después de la aplicación inicial, reponiendo la cantidad que haya sido consumida. Repetir la recorrida y tratamiento a intervalos de 4 días y luego intervalos de 1 semana, hasta que los signos de actividad de los roedores hayan desaparecido. La infestación se controla normalmente, después de 3 – 4 inspecciones y reposiciones.

PRECAUCIONES:

- Utilizar guantes, máscara y protección ocular.
- No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.
- No fumar o comer durante la aplicación.
- No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del rodenticida al ambiente.
- Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rodenticida.
- Mantener el producto en su envase original.
- No volver a utilizar los envases vacíos.
- Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos.
- Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza.
- Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.
- Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca, ojos. No comer, beber ni fumar.
- Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
- Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura.
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto directo con el producto: lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua corriente.

Si se inhala en exceso: retirar a la persona a un lugar ventilado.

Evidencia de ingestión: debido a que el producto contiene una sustancia colorante, la aparición de color alrededor de la boca puede indicar ingestión.

En caso de ingestión: no provoque el vómito. Acuda al centro asistencial más cercano posible. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO

Producto anticoagulante enérgico de actividad prolongada. Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida. El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 horas y reiterarse a las 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

EFICAZ CONTRA RATAS Y RATONES



RATICIDA - RODENTICIDA
Relampago

Rodenticida DOSIS ÚNICA
CEBO RATICIDA EN BLOQUES

COMPOSICIÓN:

Brodifacoum: 3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxychromen-2-one0.005 % p/p
colorantes, ingredientes inertes c.s.p.100 % p/p

SUPERWARFARINICO MONOSODICO RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

- **PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**
- **VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**
- **CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.**
- **LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RÓTULO Y/O PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**



Fabricado por:
REOPEN S.A.
Albert Schweitzer 2834 - Ituzaingó -
Provincia de Buenos Aires - Republica Argentina

Comercializado por:
Gleba S.A. | CUIT 30-56520990-2.
Av. 520 y Ruta Prov. 36 (1903)
Melchor Romero, La Plata Pcia de Bs.As
Tel/Fax: (0221) 491-3062

R.N.E. REOPEN S.A. Nº: 020032743
R.N.E. GLEBA S.A. Nº: 020033456
R.N.P.U.D. Nº

CUIDADO! VENENO



IMPORTANTE:

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación el tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses después de una exposición al raticida. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicológico para el tratamiento y seguimiento del paciente.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos. Guardar el producto en su envase original y en lugar seguro. No almacenar el cebo junto con materiales que por sus fuertes olores puedan alterar las propiedades organolépticas o afectar su palatabilidad y atracción para los roedores.

RIESGO AMBIENTAL:

Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua. Se recomienda quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos del producto en forma segura.

INDICACIONES PARA EL USO MÉDICO:

Grupo Químico: **Compuestos de acción anticoagulante (superwarfarinas).**
Nombre común: **: Brodifacoum**
Antídoto: **Vitamina K1 (Fitomenadiona)**

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

- **Centro de Buenos Aires:** Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel (011) 4962-6666/2247.
- **Haedo:** Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Tel (011) 4658-7777/4654-6648.
- **Córdoba:** Hospital de Urgencias Tel (0351) 427-6200 int 4135.
- **La Plata:** Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Tel (0221) 451-5555.

Advertencia: Gleba S.A. garantiza la composición cualitativa y cuantitativa de su marca, mientras este producto haya sido conservado en su envase original, cerrado, en ambientes secos y frescos y dentro de la fecha de su vencimiento. No es responsabilidad de Gleba S.A. los daños que pueda ocasionar el uso diferente al indicado en este rótulo.



Número de lote: Ver envase.
Fecha de fabricación: Ver envase.
Fecha de vencimiento: Ver envase.

Contenido Neto: 10 Kilos
Industria Argentina